Балтийский
федеральный университет
имени Иммануила Канта

Клеточные технологии в регенеративной медицине

Хазиахматова Ольга Геннадьевна

к.б.н., старший научный сотрудник Центра
иммунологии и клеточных биотехнологий

Что такое стволовая клетка?

НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ

САМООБНОВЛЕНИЕ

АСИММЕТРИЧНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Происхождение

ТИП КЛЕТОК	ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ	ВЗРОСЛЫЕ СТЕЛОВЫЕ КЛЕТКИ	ИПСК
ПОЛУЧЕНИЕ	Клетки внутренней клеточной массы бластоциста	Мультипотентные клетки из тканей взрослого человека	Соматические клетки перепрограммированные в эмбриональные плюрипотентные стволовые клетки
САМООБНОВЛЕНИЕ	Высокое	Ограниченное	Высокое
ПОТЕНТНОСТЬ	Плюрипотентность	Мультипотентность	Плюрипотентность
ДИФФЕРЕНЦИРОВКА	Может дифференцироваться на клетки трех зародышевых листочков	Ограниченные линии дифференцировки (в рамках одного зародышевого листка)	Может дифференцироваться в клетки каждого из трех зародышевых листков
СПОНТАННАЯ ОНКОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ	Присутствует	Отсутствует	Присутствует
ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ	Да	Нет	Минимальные

ПЛЮРИПОТЕНТНОСТЬ

ЭКТОДЕРМА

Эпидермис кожи, железы
кожи, волосы, ногти, нервная
система

МЕЗОДЕРМА

Мышечные, соединительные
ткани, мочевыделительная
система, половая система,
хорда

ЭНТОДЕРМА

Эпителий ЖКТ и дыхательной
системы, пищеварительные
железы

Типы плюрипотентных стволовых клеток

Эмбриональные стволовые клетки (ЭСК, ESC)

Стволовые клетки эпибласта (EpiSCs)

Эмбриональные половые клетки (Гоноцит, EGCs)

Индукцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК, IPS)

Human Embryo Day9

Эмбриональные стволовые клетки человека

Выделение

ИММУНОХИРУРГИЯ

МЕХАНИЧЕСКОЕ

ЛАЗЕРНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Эмбриональные стволовые клетки человека

Культивирование

Слой питательных клеток

Обогащенная ростовыми факторами питательная среда

Эмбриональные стволовые клетки человека

Характеристики

Тератомы

Гомогенные колонии
округлой формы

Образование химер

Эмбриональные стволовые клетки человека

Дифференцировка

ПЛОТНОСТЬ ПОСЕВА

РН

ТЕМПЕРАТУРА

КОМПОНЕНТЫ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ
СРЕДЫ

ФАКТОРЫ РОСТА

Маркер	Тип	Роль в плюрипотентности
Oct-4	Фактор транскрипции семейства POU (гомеодоменный белок)	Поддерживает самообновление и плюрипотентность. Паттерны транскрипции играют роль в определении идентичности ESC. Oct-4 / SOX-2 комплекса, играют фундаментальную роль в экспрессии генов и регуляторном контроле в ЭСК
Sox-2	Фактор транскрипции HMG-box	
Nanog	Гомеодоменные белки	
SSEA- 3	Гликолипидные углеводные антигены	Антигены специфически экспрессируются на ESC, EGC и клетках тератокарциномы человека. Любое снижение экспрессии этих антигенов связано с моделями дифференцировки и развитием.
SSEA- 4	Гликолипидные углеводные антигены	
TRA- 1-60	Кератансульфат-родственные антигены	
TRA- 1-81	Кератансульфат-родственные антигены	

Индукция плюрипотентности

Репрограммирование клеток

John B. Gurdon

1962 г.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЯДРА
somatic cell nuclear transfer
SCNT

Ian Wilmut

1996 г.

КЛОНИРОВАНИЕ
МЛЕКОПИТАЮЩЕГО

Martin Evans, Matthew

Kaufman Gail Martin

1981

КЛЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ
embryonic stem cell (ESC)

Репрограммирование клеток

Takashi Tada
2001 г.
СЛИЯНИЯ КЛЕТОК

Shinya Yamanaka
2006г.
ИПСК
iPS (induced pluripotent
stem) cells

Индукция плюрипотентности

ИНТЕГРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

НЕИНТЕГРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Индукция плюрипотентности

РИСКИ

повышение экспрессии
генов, связанных с раком

делеция одного или
нескольких онкогенов после
индукции плюрипотентности

создания более 3 месяцев

регенеративная медицина

Индукция плюрипотентности

Методы

Плюрипотентные стволовые клетки с расширенным потенциалом (EPSCs)

2017 год – мыши

2019 год – свиньи, люди

ТОТИПОТЕНТНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

Establishment of porcine and human expanded potential stem cells

Xuefei Gao^{1,2,23}, Monika Nowak-Imialek^{3,4,23}, Xi Chen^{2,23}, Dongsheng Chen^{5,6}, Doris Herrmann^{3,4}, Degong Ruan^{1,7}, Andy Chun Hang Chen⁸, Melanie A. Eckersley-Maslin⁹, Shakil Ahmad¹⁰, Yin Lau Lee⁸, Toshihiro Kobayashi¹¹, David Ryan², Jixing Zhong^{5,6}, Jiacheng Zhu^{5,6}, Jian Wu¹, Guocheng Lan¹², Stoyan Petkov^{3,4,20}, Jian Yang^{2,21}, Liliana Antunes², Lia S. Campos², Beiyuan Fu², Shengpeng Wang^{5,6}, Yu Yong², Xiaomin Wang⁷, Song-Guo Xue¹³, Liangpeng Ge¹⁴, Zuohua Liu¹⁴, Yong Huang¹⁴, Tao Nie⁷, Peng Li⁷, Donghai Wu⁷, Duanqing Pei¹⁵, Yi Zhang¹⁶, Liming Lu¹⁷, Fengtang Yang², Susan J. Kimber¹⁸, Wolf Reik⁹, Xiangang Zou¹², Zhouchun Shang^{5,6}, Liangxue Lai¹, Azim Surani¹¹, Patrick P. L. Tam¹⁹, Asif Ahmed¹⁰, William Shu Biu Yeung⁸, Sarah A. Teichmann², Heiner Niemann^{3,4,22*} and Pentao Liu^{1,2*}

We recently derived mouse expanded potential stem cells (EPSCs) from individual blastomeres by inhibiting the critical molecular pathways that predispose their differentiation. EPSCs had enriched molecular signatures of blastomeres and possessed developmental potency for all embryonic and extra-embryonic cell lineages. Here, we report the derivation of porcine EPSCs, which express key pluripotency genes, are genetically stable, permit genome editing, differentiate to derivatives of the three germ layers in chimeras and produce primordial germ cell-like cells in vitro. Under similar conditions, human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells can be converted, or somatic cells directly reprogrammed, to EPSCs that display the molecular and functional attributes reminiscent of porcine EPSCs. Importantly, trophoblast stem-cell-like cells can be generated from both human and porcine EPSCs. Our pathway-inhibition paradigm thus opens an avenue for generating mammalian pluripotent stem cells, and EPSCs present a unique cellular platform for translational research in biotechnology and regenerative medicine.

Соматические или взрослые стволовые клетки

Мезенхимальные стволовые
клетки (МСК)

Эндотелиальные стволовые
клетки-предшественники
(EPC)

Нервные стволовые клетки
(НСК)

Периваскулярные клетки (PC)

Гематopoэтические
стволовые клетки (HSC)

Эндотелиальные стволовые клетки-предшественники (ЕСС)

клоногенность, самообновление и потенциал дифференцировки

CD34, CD146, CD45, CD115, CD14, CD133, VEGFR1, VEGFR2 (или KDR)

Формирование новых кровеносных сосудов

средство регенерации эндотелия

биологические маркеры сосудистой функции

Перициты

располагаются вокруг эндотелия микрососудистых капилляров

Ангиогенез

Инициирование неоваскуляризации

Регуляция кровотока

Дифференцировка: адипоциты, остеобласты, хондробласты, фибробласты, гладкомышечные клетки и нервные клетки

Стволовые клетки пуповинной крови человека (УСВ)

Мезенхимальные стромальные клетки (МСК)

МСК обычно располагаются в периваскулярной нише, что позволяет им быть более динамичными и легко мигрировать внутри системы кровообращения к поврежденным тканям для поддержания и восстановления.

МСК

Источники

BM-MSCs

AD-MSCs

UC-MSC

Sources of MSCs

MESODERM ORIGIN

Bone marrow

Adipose tissue

Cartilage
Synovial fluid

Muscle
Tendon

Myocardium

Fetal tissues

- Umbilical cord
- Placenta
- Amniotic fluid
- Amniotic membrane

ENDODERM ORIGIN

Respiratory
system

GIT tract

Liver

Pancreas

ECTODERM ORIGIN

Neural tissue

Skin tissue

Cornea

Dental pulp

SECRETION & EXCRETION

Milk

Menstrual blood

Urine

МСК

Характеристика

Трехлинейная дифференцировка

Адгезия к пластику

хондрогенная среда,
гликопротеины,
окрашенные Alcian Blue

остеогенная среда, области с
минерализованным межклеточным
веществом окрашены Alizarine Red

адипогенная
среда,
нейтральные
триглицериды с
окраской Oil Rad
и липиды

Экспрессия маркеров

МСК

Биологические функции

Ограниченное количество митотических делений

Миграция и хоуминг

Трофические свойства

Иммуносупрессия

Дифференцировка: адипогенные, остеогенные и хондрогенные клетки, ЭК, гладкие мышцы сосудов и миоциты

Гематopoэтические стволовые клетки (HSC)

Гематopoэтические стволовые клетки (HSC)

Гематopoэтические стволовые клетки (HSC)

Строение трубчатой кости

Гематopoэтические стволовые клетки (HSC)

bone marrow (BM)-on-a-chip

Получение первичной клеточной культуры

Жировая ткань (АТ)

Костный мозг (ВМ)

Ферментативное расщепление

антитела

Культивирование эксплантатов

Ферментация жировой ткани

Выделение клеток костного мозга

Эксплант

Первичная культура клеток

Клетки выделенные из
сердца мыши

Дермальный эксплант

Гетерогенная культура
костного мозга

Культура клеток

МОНОСЛОЙ КЛЕТОК

Условия культивирования

Клеточная адгезия

METHOD OF TRYPsinIZATION

МСК при повреждении миокарда

Культивирование клеток в условиях гипоксии повышает эффективность трансплантации МСК

Intravenously Delivered Mesenchymal Stem Cells: Systemic Anti-Inflammatory Effects Improve Left Ventricular Dysfunction in Acute Myocardial Infarction and Ischemic Cardiomyopathy.

Luger D¹, Lipinski MJ¹, Westman PC¹, Glover DK¹, Dimastromatteo J¹ , Frias JC¹ , Albelda MT¹, Sikora S¹, Kharazi A¹, Vertelov G¹, Waksman R¹, Epstein SE¹

Circ Res. 2016 Mar 18; 118(6): 970–983.

PMCID: PMC4894788

Published online 2016 Mar 17. doi: [10.1161/CIRCRESAHA.115.307516](https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.115.307516)

PMID: [26838793](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26838793/)

A Large-Scale Investigation of Hypoxia-Preconditioned Allogeneic Mesenchymal Stem Cells for Myocardial Repair in Nonhuman Primates

Paracrine Activity Without Remuscularization

Xinyang Hu,^{*} Yinchuan Xu,^{*} Zhiwei Zhong, Yan Wu, Jing Zhao, Yingchao Wang, Haifeng Cheng, Min Fengjiang Zhang, Qi Chen, Jianzhong Sun, Qian Li, Jing Jin, Qingju Li, Lihong Chen, Chen Wang, H Youqi Fan, Qian Yang, Lei Yu, Rongrong Wu, Jie Liang, Jinyun Zhu, Ya Wang, Yiping Jin, Yifan Lin, F Liangliang Jia, Wei Zhu, Jinghai Chen, Hong Yu, Jianyi Zhang,[✉] and Jian'an Wang[✉]

J Am Coll Cardiol. Author manuscript; available in PMC 2013 Feb 25.

Published in final edited form as:

J Am Coll Cardiol. 2009 Dec 8; 54(24): 2277–2286.

doi: [10.1016/j.jacc.2009.06.055](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.06.055)

A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Dose-Escalation Study of Intravenous Adult Human Mesenchymal Stem Cells (Prochymal) After Acute Myocardial Infarction

Joshua M. Hare, MD,^{*} Jay H. Traverse, MD,[†] Timothy D. Henry, MD,[†] Nabil Dib, MD,[‡] Robert K. Strumpf, MD,[‡] Steven P. Schulman, MD,[§] Gary Gerstenblith, MD,[§] Anthony N. DeMaria, MD,^{||} Ali E. Denktas, MD,^{||} Roger S. Gammon, MD,[#] James B. Hermiller, Jr, MD,^{**} Mark A. Reisman, MD,^{††} Gary L. Schaer, MD,^{††} and Warren Sherman, MD^{§§}

PMCID: PMC3580848

NIHMSID: NIHMS168198

PMID: [19958962](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19958962/)

МСК, полученные из костного мозга, могут смягчить последствия инфаркта миокарда

МСК для регенерации хряща

- Запуск продукции коллагена типа II для усиления регенерации мениска
- Ускорение восстановления переломов
- Облегчение боли и значительное улучшение качества хрящевой ткани при остеоартрите

Clinical Trial > Transplantation. 2013 Jun 27;95(12):1535-41. doi: 10.1097/TP.0b013e318291a2da.

Treatment of knee osteoarthritis with autologous mesenchymal stem cells: a pilot study

Luis Orozco¹, Anna Munar, Robert Soler, Mercedes Alberca, Francesc Soler, Marina Huguet, Joan Sentís, Ana Sánchez, Javier García-Sancho

Affiliations + expand

PID: 23680930 DOI: 10.1097/TP.0b013e318291a2da

МСК при заболевании легких

- Комбинированное использование улучшает показатели качества жизни
- Снижение степени тяжести бронхолегочной дисплазии

Clinical Trial > Stem Cells Transl Med. 2017 Mar;6(3):962-969. doi: 10.1002/sctm.16-0315.

Epub 2016 Dec 9.

Combined Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stromal Cell Therapy and One-Way Endobronchial Valve Placement in Patients with Pulmonary Emphysema: A Phase I Clinical Trial

Hugo Goulart de Oliveira ^{1 2}, Fernanda Ferreira Cruz ³, Mariana Alves Antunes ³, Amarilio Vieira de Macedo Neto ^{1 2}, Guilherme Augusto Oliveira ², Fabio Munhoz Svartman ^{1 2}, Tamara Borgonovo ⁴, Carmen Lucia Kuniyoshi Rebelatto ⁴, Daniel J Weiss ⁵, Paulo Roberto Slud Brofman ⁴, Marcelo Marcos Morales ³, José Roberto Lapa E Silva ⁶, Patricia Rieken Macedo Rocco ³

МСК при заболеваниях печени

- После трансплантации МСК наблюдались неоваскуляризация, структура, подобная желчным канальцам, и некоторые гепатоцитоподобные клетки
- Улучшение функции печени

Clinical Trial > [Stem Cell Rev Rep. 2012 Sep;8\(3\):972-81. doi: 10.1007/s12015-011-9322-y.](#)

Phase II trial: undifferentiated versus differentiated autologous mesenchymal stem cells transplantation in Egyptian patients with HCV induced liver cirrhosis

Mervat El-Ansary¹, Iman Abdel-Aziz, Sherif Mogawer, Samah Abdel-Hamid, Olfat Hammam, Salwa Teaema, Marwa Wahdan

Affiliations + expand

PMID: 21989829 DOI: [10.1007/s12015-011-9322-y](#)

Фотография недифференцированной и дифференцированной культуры МСК;
a,b,c,d Недифференцированные мезенхимальные клетки,
e,f ,g,h Новообразованные гепатоциты

МСК при желудочно-кишечных заболеваниях

- Улучшают структуру эпителия толстой кишки
- Повышают проницаемость
- Ремиссия

Clinical Trial > Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Jan;12(1):64-71. doi: 10.1016/j.cgh.2013.06.021.

Epub 2013 Jul 19.

A phase 2 study of allogeneic mesenchymal stromal cells for luminal Crohn's disease refractory to biologic therapy

Geoffrey M Forbes¹, Marian J Sturm², Rupert W Leong³, Miles P Sparrow⁴, Dev Segarajasingam⁵, Adrian G Cummins⁶, Michael Phillips⁷, Richard P Herrmann²

Affiliations + expand

PMID: 23872668 DOI: 10.1016/j.cgh.2013.06.021

Терапия стволовыми клетками при заболеваниях сетчатки

- ИПСК человека, успешно восстанавливают функцию сетчатки
- ЭСК скорректировали остроту зрения и повысили показатели качества жизни при дегенерации желтого пятна
- Образование новых межклеточных связей, регенерация клеток и прогрессирование различных зрительных функций

[Cells](#). 2017 Mar; 6(1): 4.

Published online 2017 Feb 2. doi: [10.3390/cells6010004](https://doi.org/10.3390/cells6010004)

PMCID: PMC5371869

PMID: [28157165](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28157165/)

Stem Cell Therapies in Retinal Disorders

[Aakriti Garg](#),¹ [Jin Yang](#),^{1,2} [Winston Lee](#),^{1,2} and [Stephen H. Tsang](#)^{1,2,*}

Ilyas Singeç, Academic Editor

[▶ Author information](#) ▶ [Article notes](#) ▶ [Copyright and License information](#) [Disclaimer](#)

[Review](#) > [Invest Ophthalmol Vis Sci](#). 2016 Apr 1;57(5):ORSFc1-9. doi: [10.1167/iovs.15-18681](https://doi.org/10.1167/iovs.15-18681).

Subretinal Transplantation of Embryonic Stem Cell-Derived Retinal Pigment Epithelium for the Treatment of Macular Degeneration: An Assessment at 4 Years

[Steven D Schwartz](#)¹, [Gavin Tan](#)², [Hamid Hosseini](#)¹, [Aaron Nagiel](#)¹

Affiliations + expand

PMID: 27116660 DOI: [10.1167/iovs.15-18681](https://doi.org/10.1167/iovs.15-18681)

Секретом стволовых клеток в регенеративной медицине

- растворимые белки
 - цитокины,
 - хемокины
 - факторы роста
- липиды
- внеклеточные везикулы (EV)

Клеточная терапия неврологических заболеваний

- Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки-предшественники нейральных клеток способствуют функциональному восстановлению после **инсульта**
- МСК способствуют внутренним защитным и репаративным механизмам после **травмы головного мозга**
- Нервные клетки-предшественники и МСК оказывают терапевтическое действие на **болезнь Паркинсона**
- Секретом способствует восстановлению опорно-двигательного аппарата при **травмах спинного мозга**

[Sci Rep.](#) 2017; 7: 1943.

Published online 2017 May 16. doi: [10.1038/s41598-017-02137-w](https://doi.org/10.1038/s41598-017-02137-w)

PMCID: PMC5434043

PMID: [28512358](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28512358/)

Delayed epidural transplantation of human induced pluripotent stem cell-derived neural progenitors enhances functional recovery after stroke

[I-Hui Lee](#),^{1,2} [Shiang-Suo Huang](#),^{3,4} [Ching-Yu Chuang](#),^{5,6} [Ko-Hsun Liao](#),¹ [Li-Hsin Chang](#),² [Chia-Chi Chuang](#),¹ [Yu-Shih Su](#),² [Hung-Jui Lin](#),⁷ [Jui-Yu Hsieh](#),⁷ [Shu-Han Su](#),⁷ [Oscar Kuang-Sheng Lee](#),^{8,9,10} and [Hung-Chih Kuo](#)^{5,6}

[▶ Author information](#) ▶ [Article notes](#) ▶ [Copyright and License information](#) [Disclaimer](#)

Балтийский
федеральный университет
имени Иммануила Канта

Спасибо за внимание!!!